

# PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO USO DE NARGUILÉ E CIGARRO ELETRÔNICO POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Andrei Meira de Oliveira<sup>1</sup>, Gabriel Silva Dias<sup>1</sup>, Luzinete Taynara Tenório Bezerra<sup>1</sup>, Nathine Maria Martins Assunção<sup>1</sup>, Rodrigo de Paiva Oliveira Silva<sup>1</sup>, Marcelo Fouad Rabahiz<sup>2</sup>

1. Discente do curso de medicina Centro Universitário UniEVANGÉLICA;
2. Docente curso de medicina Centro Universitário UniEVANGÉLICA.

**RESUMO:** O tabagismo é considerado um problema de saúde pública e apesar da queda da prevalência deste, uma grande quantidade de jovens ainda experimenta diversas formas de uso, o que os tornam vulneráveis à iniciação e, conseqüentemente, à dependência tabágica. Todas as formas de utilização do tabaco têm em comum a liberação de nicotina para o sistema nervoso central, dentre elas o narguilé e cigarro eletrônico. O presente trabalho tem por objetivo identificar a prevalência e fatores associados ao uso de narguilé e cigarro eletrônico entre universitários. Será realizada uma pesquisa epidemiológica, analítica transversal, de análise quantitativa norteada pelo método positivista com universitários da UniEVANGÉLICA, Onde será utilizada uma entrevista estruturada sugerida por Martins et al (2014), a partir de perguntas provenientes de Global Health Professions Student Survey (2005) aos alunos que estejam regularmente matriculados nos cursos de Direito, Engenharia Civil e Medicina. Espera-se com essa pesquisa avaliar prioritariamente a prevalência e fatores associados ao início do uso do tabaco através dos dois dispositivos citados.

**Palavras-chave:**

Narguilé. Cigarro eletrônico. Fumo. Tabaco. Universitários.