

## **Complicação em ceratite herpética com leucoma central por dificuldade de diagnóstico diferencial**

Celso Antunes Borges Filho<sup>1</sup>; Luiza Soares Dantas<sup>1</sup>; Mateus Tavares de Souza<sup>1</sup>; Matthew Paz Carvalho<sup>1</sup>; Nathalia Lelitscewa Bela Cruz Potenciano<sup>1</sup>; Humberto de Sousa Fontoura<sup>2</sup>

1. *Discente do Curso de medicina Centro Universitário UniEVANGÉLICA*
2. *Docente do Curso de medicina Centro Universitário UniEVANGÉLICA*

**RESUMO:** A ceratite consiste na inflamação da córnea e sua principal causa é a infecciosa, causada frequentemente por vírus ou bactérias. Os primeiros sintomas da infecção ocular por herpesvírus simples (HSV) e por bactéria consistem em fotofobia, lacrimejamento e redução da visão. As infecções se diferem quanto ao padrão de irritação ocular, a viral apresenta uma anestesia da córnea sendo que na infecção bacteriana ocorre dor e em casos mais agudos, secreção purulenta e hiperemia conjuntival. O presente trabalho tem como objetivo relatar a dificuldade do diagnóstico diferencial destas ceratites. O relato foi feito com base em análise transversal de oftalmopatia de paciente não identificado, durante consultas oftalmológicas, em um hospital de olhos em Anápolis-GO.

**Palavras-chave:**

Ceratite bacteriana.  
Ceratite herpética.  
Córnea.