

ANOMALIA DENTÁRIA SUPRANUMERÁRIA

Geovanna Rafael MARTINS, Julia Barbosa MARTINI, Larissa CALDEIRA Alves Mendes, Lucas Soares GODOY da Cunha, Natalia de OLIVEIRA, Stefany Fernandes MENDES, Denise Campos AMARAL, Diana RIBEIRO E SILVA.

Introdução: Existem anomalias de dentes supranumerários também podendo ser chamados de hiperdontia, que acontece quando um indivíduo excede os números normais de dentes contidos na cavidade bucal, sendo dentição permanente com 32 dentes e a dentição decídua com 20 dentes. Os dentes supranumerários podem causar inúmeros distúrbios na fala e na alimentação. Portanto diagnósticos feitos precocemente podem evitar e/ou minimizar estes distúrbios. **Objetivos:** Analisar onde as anomalias dentárias ocorrem com maior frequência, descobrir por que são eventualmente mais manifestados em determinados tipos de pessoas, de maneiras diferentes, em qual arcada é mais proeminente a repetição de um determinado dente, apontar quais formas um dente pode tomar e qual se repete mais. **Revisão:** Quando a hiperdontia está exposta na cavidade bucal, o diagnóstico pode ser obtido através de exames clínicos simples de rotina, e se o dente permanecer retido dentro do alvéolo, o diagnóstico é dado através de exames radiográficos e tomográficos. Quando se encontra um supranumerário, tanto irrompido quanto retido, que esteja interferindo na oclusão normal dos dentes, deve-se extraí-lo desde que este não atrapalhe o desenvolvimento dos dentes vizinhos. **Considerações finais:** o agravamento da dentição supranumerária pode gerar deslocamento dos dentes do hemiarco. Seu tratamento envolve acompanhamento do caso e/ou procedimentos cirúrgicos. Se as anomalias forem detectadas com antecedência, uma vez que se necessário a intervenção cirúrgica, o cirurgião dentista obterá maior tempo para conseguir um tratamento do sucesso. Com isso temos a intenção de proporcionar saúde bucal, função mastigatória adequada e devolver autoestima e estética ao paciente.